

# КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРОТЕЗИРОВАНИЮ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВРАЧ СМОЖЕТ ПЕРЕЙТИ НЕПОСРЕДСТВЕННО К УСТАНОВКЕ ПРОТЕЗА, ОН ДОЛЖЕН ПРОВЕСТИ РЯД МАНИПУЛЯЦИЙ.

ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ, КОТОРЫЕ ЗАТРАГИВАЮТ ПОДГОТОВКУ К ПРОТЕЗИРОВАНИЮ КОРОНКОЙ, ЭСТЕТИЧНЫМИ НАКЛАДКАМИ (ВИНИРАМИ, ЛЮМИНИРАМИ), А ТАКЖЕ ИМПЛАНТАЦИИ.

## 1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

1. Консультацию врача-стоматолога и осмотр полости рта пациента;
2. Рентгеновский снимок и ортопантограмму (обзорный снимок, на котором видно положение всех зубов, особенности строения челюстей и состояние костной ткани);
3. Составление плана лечения, выбор протеза;
4. Профессиональную гигиену, которая включает в себя снятие твердых отложений ультразвуком, удаление бактериального налета, шлифовку эмали и обработку фторсодержащими препаратами.

## 2 ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕД ПРОТЕЗИРОВАНИЕМ

Если первый этап обязателен для всех пациентов, то второй зависит от индивидуальных показаний.

Важно помнить, что протезирование при воспалительных процессах в полости рта (например, при пародонтозе) категорически запрещено: перед установкой коронок или имплантов необходимо вылечить кариес и его осложнения – пульпит, периодонтит, а также любые воспаления мягких тканей и слизистых оболочек.

Без лечения десен перед протезированием также не обойтись, даже когда речь идет о простой кровоточивости.

Если пренебрегать этими манипуляциями, высок риск того, что зуб под коронкой начнет разрушаться, и протез в скором времени придется менять.

При серьезных нарушениях прикуса перед протезированием необходимо провести ортодонтическое лечение и исправить дефект.

При установке моста важно, чтобы опорные зубы были правильно расположены и могли равномерно распределить жевательную нагрузку.

## 3 ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕД ПРОТЕЗИРОВАНИЕМ

Когда все проблемы устранены, врач приступает к подготовке зуба. Она может включать частичное или полное удаление корня, а также депульпацию – удаление нервов в корневых каналах.

Эта процедура проводится по показаниям и необходима далеко не всегда, ведь депульпированный зуб быстрее разрушается, соответственно, пациенту быстрее понадобится новый протез.

Наконец, при установке коронки, моста или винира необходимо препарировать зуб – обточить эмаль для компенсации толщины протеза.

